

Confronto tra le indagini T0 (2025) e T1 (2026)

Virus respiratorio sinciziale (VRS)

Come cambiano conoscenze, opinioni ed esperienza della campagna di immunizzazione tra le due rilevazioni.

— Un'indagine della Federazione Italiana Medici Pediatri

710

RISPONDENTI T0
MAG-SET 2025

608

RISPONDENTI T1
GIU-OTT 2026

13

DOMANDE CONFRONTATE
PIÙ 3 SUL PROFILO

10

CON VARIAZIONI
SIGNIFICATIVE
TEST Z · P < 0,05

Il confronto in sintesi

Il report mette a confronto le due indagini FIMP tra i Pediatri di Famiglia sulle strategie di prevenzione del virus respiratorio sinciziale (VRS): **T0**, maggio–settembre 2025, con **710 risposte** da 19 regioni, e la verifica **T1**, giugno–ottobre 2026, con **608 risposte** da 19 regioni. Delle 13 domande riproposte con le stesse opzioni, **10 mostrano variazioni statisticamente significative**: crescono la percezione della gravità, l'immunizzazione nel proprio studio e la quota di chi non incontra difficoltà; diminuiscono le barriere legate alla conoscenza delle famiglie e alla sicurezza e le difficoltà di approvvigionamento. Le differenze sono espresse in punti percentuali (pp), T1 meno T0.

+9,4 pp

considera molto grave l'infezione da VRS nel primo anno di vita (dal 28,6% al 38,0%)

+7,9 pp

conosce la vaccinazione materna in gravidanza (dal 67,9% al 75,8%)

–7,5 pp

conosce il palivizumab, riservato alle categorie a rischio (dal 70,7% al 63,2%)

+2,0 pp

ritiene utile una profilassi universale nei neonati (dal 97,7% al 99,7%)

+7,1 pp

ritiene che la vaccinazione materna non sia una strategia efficace (dall'1,1% all'8,2%)

–13,8 pp

indica la scarsa conoscenza delle famiglie tra le barriere alla profilassi (dal 43,9% al 30,1%)

–12,2 pp

segnala preoccupazioni sulla sicurezza tra le barriere (dal 33,1% al 20,9%)

+9,3 pp

non indica alcuna barriera alla profilassi (dal 24,9% al 34,2%)

+10,1 pp

considera la chiamata attiva uno strumento utile per comunicare con le famiglie (dal 70,8% all'80,9%)

+3,5 pp

riferisce che nella propria regione è stata effettuata la campagna di immunizzazione (dal 96,2% al 99,7%)

+18,3 pp

di chi ha aderito ha effettuato l'immunizzazione nel proprio studio (dal 64,0% all'82,3%)

–21,6 pp

di chi ha aderito ha avuto difficoltà di approvvigionamento (dal 46,9% al 25,3%)

NOTE DI LETTURA


- Per ciascuna rilevazione le percentuali sono calcolate sul numero dei suoi rispondenti alla domanda; le differenze sono in punti percentuali (pp), T1 meno T0, sui valori arrotondati riportati nei grafici.
- T0 e T1 sono due campioni indipendenti: le differenze descrivono come cambiano le quote, non le risposte delle stesse persone, e possono riflettere anche la diversa composizione dei campioni (sezione 01).
- Nei grafici il pallino chiaro è il T0, quello scuro il T1; l'ultima colonna riporta la differenza. Una differenza è significativa quando il test z per due proporzioni indipendenti dà $p < 0,05$; le differenze non significative sono in grigio.
- Si confrontano solo le opzioni presenti con lo stesso significato in entrambe le rilevazioni. Non sono confrontabili la domanda 4, la 14.1 e l'opzione intermedia della 11; le domande introdotte al T1 (8.1 e 18–21) sono riportate nel report T1.
- La rilevazione T1 comprende le risposte raccolte fino al 13/10/2026.

01

Profilo dei due campioni


Distribuzione geografica, anzianità di laurea e assistiti

1 Regione di appartenenza




Composizione dei due campioni: le differenze tra T0 e T1 possono dipendere anche dalla diversa distribuzione regionale dei rispondenti.

2 Anzianità di laurea (in anni)



3 Numero di assistiti




02


Percezione e conoscenza

Gravità dell'infezione e strategie preventive conosciute


5 Quanto ritieni grave un'infezione da VRS nel primo anno di vita?



6 Sei a conoscenza della disponibilità in Italia di misure preventive contro il VRS?



7 Quali strategie preventive conosci?




Domanda a risposta multipla: percentuali sul totale dei rispondenti di ciascuna rilevazione.

03


Informazione e opinioni sulla profilassi

Informazione alle famiglie, profilassi universale, LEA e vaccinazione materna


8 Hai già avuto occasione di informare le famiglie dei tuoi assistiti sulle nuove strategie di prevenzione?



9 Ritieni utile una profilassi universale contro il VRS nei neonati?




10 Sei favorevole all'introduzione strutturata nei LEA della profilassi anti-VRS?



Al T1 nessun rispondente ha scelto "Sì, solo se rimborsata dal SSN": l'aumento dei "Sì" senza condizioni va letto insieme a questo dato; la quota complessiva di favorevoli resta quasi invariata.

11 Ritieni che la vaccinazione materna in gravidanza sia una strategia efficace?




L'opzione intermedia non è confrontabile: "Da valutare meglio" al T0, "non saprei" al T1.

04

Barriere, comunicazione e formazione


Ostacoli alla profilassi, strumenti per le famiglie e interesse per l'aggiornamento

12 Quali sono le principali barriere alla profilassi anti-VRS nei neonati?




Domanda a risposta multipla: percentuali sul totale dei rispondenti di ciascuna rilevazione. Al T1 sono state aggiunte tre opzioni (counselling, esecuzione dell'immunizzazione, aspetti tecnici/operativi), scelte da una parte dei rispondenti: le quote delle opzioni comuni vanno lette tenendone conto.

13 Quali strumenti ritieni utili per migliorare la comunicazione con le famiglie?



Domanda a risposta multipla: percentuali sul totale dei rispondenti di ciascuna rilevazione. Al T1 è stata aggiunta l'opzione "Altro".

14 Sei interessato a ricevere formazione aggiornata sul tema?




Al T1 "interessato" comprende la nuova opzione "Sì, ma solo ECM". La domanda 14.1 (modalità formativa) non è confrontabile: al T1 sono cambiati opzioni e destinatari.

05


Campagna di immunizzazione

Attuazione regionale, modalità di adesione e difficoltà


15 Nella tua regione è stata effettuata la campagna di immunizzazione contro il VRS?



16 Se hai aderito alla campagna, hai...



17 Se hai aderito alla campagna, hai avuto difficoltà relativamente...



Domanda a risposta multipla: percentuali sul totale dei rispondenti di ciascuna rilevazione.

-21,6 pp

la quota di chi, avendo aderito alla campagna, segnala difficoltà di **approvvigionamento** (dal 46,9% al 25,3%); chi immunizza nel proprio studio passa dal 64,0% all'82,3%.