Circolare Ministeriale, Prevenzione e Controllo dell'Influenza: Raccomandazioni per la stagione 2026-2027

Chi vaccinare

La vaccinazione antinfluenzale viene **offerta attivamente e gratuitamente:**

- ✓ **Prioritariamente a tutti i bambini con patologia cronica**
- ✓ **Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compresi**
- ✓ **Bambini con familiari e contatti ad alto rischio di complicanze** (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)

Per ulteriori dettagli sui gruppi target, si rimanda alla **Tabella 2 della Circolare Ministeriale**, che trovate **allegata alla newsletter**, relativa alle persone a rischio di complicanze ed ospedalizzazione.

Indipendentemente dai gruppi a rischio specificati, i Pediatri possono applicare il loro **giudizio clinico** per tenere conto del rischio di influenza che aggrava eventuali malattie di base ed offrire, in questi casi, il vaccino gratuitamente.

Inoltre, dopo aver vaccinato le categorie di popolazione eleggibili è possibile offrirlo gratuitamente **a chiunque lo richieda**.

Dove vaccinare

L'**ambulatorio** del Pediatra di Famiglia è il luogo ideale per la somministrazione del vaccino.

Con quale vaccino

- **Vaccino inattivato trivalente sub-unità o split - VIT** (da 6 mesi di età)
- **Vaccino inattivato trivalente su colture cellulari - VITcc** (da 6 mesi di età)
- **Vaccino trivalente vivo attenuato - LAIV** (da 2 anni di età)

Composizione dei vaccini disponibili

Secondo le indicazioni OMS del 27.02.2026 la composizione dei vaccini è la seguente:

Vaccini trivalenti ottenuti in uova embrionate di pollo

- A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-like virus
- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus
- B/Tokyo/EIS13-175/2025-like virus (lignaggio B/Victoria)

Vaccini trivalenti ottenuti su colture cellulari o ricombinanti o acidi nucleici

- A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-like virus
- A/Darwin/1415/2025 (H3N2)-like virus
- B/Pennsylvania/14/2025-like virus (lignaggio B/Victoria)

Dosi da somministrare

- **2 dosi**, a distanza di almeno 4 settimane, per **bambini di età inferiore ai 9 anni vaccinati per la prima volta**
- **1 dose**, per **bambini di età uguale o superiore ai 9 anni** e per **bambini già vaccinati negli anni precedenti**

Quando vaccinare

- **Prima possibile!** Già all'inizio di ottobre se il vaccino è disponibile, per consentire una copertura ottimale prima del picco stagionale, specialmente per i bambini che necessitano della seconda dose
- Il vaccino deve essere **offerto in qualsiasi momento della stagione influenzale**, specialmente in caso di stagione influenzale tardiva o se si presentano bambini a rischio non ancora vaccinati
- La vaccinazione è raccomandata anche se vengono riferiti **precedenti episodi simil-influenzali**

Il vaccino può essere **co-somministrato** con tutti gli altri vaccini

Per il vaccino vivo attenuato: **attendere 4 settimane dalla somministrazione** di un altro vaccino vivo attenuato se non somministrati insieme

Chi non vaccinare

- Bambini che abbiano manifestato **reazione allergica grave (anafilassi)** dopo la somministrazione di una precedente dose
- Bambini con anamnesi positiva per **sindrome di Guillain-Barré** insorta entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose

Controindicazioni per il vaccino vivo attenuato (LAIV):

- Immunodeficienza clinica per condizioni o terapie immunosoppressive
- Asma severo o dispnea attiva
- Contatti stretti di persone gravemente immunocompromesse
- Bambini e adolescenti <18 anni in terapia con salicilati
- Asplenia anatomica o funzionale